NATURE & DECOUVERTE

■ GAZOUILLIS 26par Guillemette Alquier



I existe plusieurs sortes de pigeons : le ramier (appelé « palombe » dans le sud), le colombin, le biset - celui qui se fait avoir - et bien d'autres. On en dénombre en effet au moins 36 espèces à travers le monde, sans compter les tourterelles qui sont en fait de petits pigeons. On trouve en Europe la tourterelle des bois, la tourterelle turque et les 3 espèces de pigeons citées plus haut. Et les colombes alors ? Eh bien, ce terme ne désigne pas une espèce, c'est simplement une appellation populaire qui souvent désigne un pigeon... blanc. Mais pigeons et tourterelles sont des colombidés, du mot « colombe ». Pigé ?

Morphologie Tous ces oiseaux ont en commun de gros pectoraux soutenus par un beau bréchet, des ailes développées, un bec et des pattes courts à 4 doigts (au bout des pattes et non du bec!).

À tout coup, on les identifie par leur cou : les ramiers ont une tache blanche sur le côté du cou, les colombins ont du vert métallique sur le cou. La tourterelle turque a une barre horizontale noire sur le cou, la tourterelle des bois (plus rare) a 3 ou 4 rangées de raies blanches et noires sur le cou. Une exception, bien sûr, les bisets, qui ont le croupion blanc et vu par-dessous les plumes des aisselles blanches (guili guili).

Monsieur et Madame sont semblables : on n'a jamais remarqué de décolleté fort pigeonnant chez cette dernière!

dans les airs en faisant claquer ses ailes, puis il redescend en vol plané queue déployée. Chez les tourterelles, quand on est amoureux, on s'bécote sur les branches publiques. comme deux tourtereaux. Ensuite, pas question de s'embêter à confectionner un nid! Quelques branchages suffisent disposés à la « va comme je te pousse » dans un arbre (on voit les œufs par en dessous et parfois ils passent à travers!) ou dans un bâtiment. Les deux parents couvent. Les oisillons sont nourris au lait! Pas du lait de vache bien sûr, (vous les imaginez traire!) encore moins du « lait de poule », mais du lait de pigeon! Ces oiseaux produisent en effet dans leur jabot spécialement conçu une sorte de bouillie blanche appelée lait de jabot. Papa et Maman produisent ce lait pratique non ? Bébé va chercher ce lait directement en mettant le bec dans la gorge de leurs parents (sgloup!), on est bien loin de la tétée! Ils sont nourris exclusivement avec pendant trois jours, puis c'est le sevrage. Peu à peu en effet, Papa Maman introduisent des graines dans l'alimentation, à 18 jours les bébés mangent comme les grands. Les flamands roses aussi ont cette particularité, sauf que leur lait est rose, cela va de soi!

Alimentation Ce sont des herbivores, ils adorent les graines qu'ils picorent souvent allègrement dans les champs... Ils aiment donc bien les petits pois (ah! le pigeon et les petits pois tout un programme et un tout un problème, palombe d'un doute!). La tourterelle des bois est plus raffinée, elle mange les graines sur pied, la fumeterre notamment et quand il n'y a plus de son mets préféré, elle part en Afrique. Na!

Ils boivent à la paille aussi! Enfin... contrairement aux autres oiseaux qui remplissent leur bec et renversent ensuite la tête en arrière pour avaler, ils aspirent, rien que de l'eau bien sûr, en immergeant entièrement leur bec dans l'eau. Ils avalent ainsi le liquide en continu, comme nous buvons un verre d'eau! Les flamands roses ne le font pas...vous avez vu leur bec!

Chant Tout le monde le reconnait, il existe pourtant des variations considérables entre individus et espèces. On dit qu'ils roucoulent, caracolent, termes qui s'emploient aussi pour nous, pauvres humains...on dit aussi qu'ils jabottent, là je vois moins de correspondance avec nous...

Les pigeons et tourterelles ont toujours été proches des hommes. Ceux-ci les ont dressés comme messagers, élevés dans des colombiers, chassés... Pigeons de nos villes,

les bisets ont panaché leurs couleurs peu à peu au gré des croisements. Mais dans tout cela n'oublions pas le symbole de la colombe!

G.A.



3. Alquier